

ROSA HUDSONIANA

Subcommbos

R. HUDSCHIANA fl. submultiplici. THY. Prod. p. 147.

LE ROSIER D'HUDSON

à fleurs presque en corymbe.

DESCRIPTION.

Ce Rosier s'élève à deux ou trois pieds. Ses termeches, diffoses, rougeatres, particulièrement sur les passes exposées au soleil, sont absolument dépourvues d'aiguillons. Ses feuilles se composent de cinq, sept, ou neuf folioles de forme elliptiqueallongée, pointues à la base et au sommet, glabres sur les deux faces, vertes en-dessus, glauques en-dessous, finement et simplement dentées en scie. Le pétiole qui les supporte est légèrement velu; on y rencontre parfois quelques petits aiguillons. Il est muni de stipules étroites et bifides, repliées sur elles-mêmes. Les fleurs se réunissent, en une espèce de corymbe, à l'extrémité des rameaux. Les pédoncules qui les supportent sont garnis d'un petit nombre de poils glanduleus. Les tubes des calices, ovoïdes-allongés, sont indifférerquess glabres ou munis de quelques poils sur le même arbrisseau. Les divisions du limbe sont simples, pointues ou spatulées an sommet, glanduleuses à l'extérieur et sur leur bordure, et couvertes d'un duvet blanchâtre à l'intérieur. La corolle presente cinq ou six rangs de pétales, d'un rose-tendre irrégulie-

Rosa Budsoniana Subcorymbosa. Roster d'budson à fleurs presqu'en Corymbe.

Guerante pino.

Guerante de Remont.

Eug. Tatbaux sculp.